

# Agaricus praeclaresquamosus Freeman

*A. moelleri*, *A. placomyces*, *Psalliota meleagris*

5



## CAPPELLO

poco carnoso e sottile, emisferico e con diametro che raggiunge al massimo i 15 cm; la cuticola presenta minute squame fuliginoso-brunastre su un fondo biancastro che partono dal margine; al disco la cuticola rimane non dissociata e di colore brunastro. Il margine risulta debordante, bianco e nettamente distinguibile.



## IMENOFORO

con lamelle inizialmente bianche, poi rosa pallido, infine bruno scuro, con tagliente sterile e pallido.



## GAMBO

sottile, cilindrico, slanciato e con bulbo marginato; dall'aspetto liscio e sericeo, ingiallisce al tocco; è ornato nella parte alta da un ampio **anello** supero e denticolato.



## CARNE

di colore bianco latte al taglio vira al giallo, specie alla base del gambo; odore di fenolo o di inchiostro, sapore sgradevole.



## SPORE

bruno porpora in massa.



## HABITAT

in zone boschive molto umide e ombrose, dall'estate all'autunno.



## COMMESTIBILITÀ

tossico.



## NOTE

potrebbe confondersi vagamente con l'*Agaricus impudicus* - che presenta invece un odore simile a quello della *Lepiota cristata* - oppure con l'*Agaricus phaeolepidotus*. Tuttavia, quest'ultimo fungo si differenzia dall'*Agaricus praeclaresquamosus* per avere la superficie del cappello tendente al rossastro.

