

Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet

36

Clitocibe inornata



CAPPELLO

può raggiungere il diametro di 12 cm, inizialmente piano-convesso poi piano, depresso ed un po' imbutiforme, mediamente carnoso; cuticola di colore grigio-brunastro o interamente grigio, margine costolato ed a lungo involuto.



IMENOFORO

a lamelle fitte, da adnate a subdecurrenti sul gambo, grigio-biancastre poi grigio-brunastre, con lamellule di diversa lunghezza.



GAMBO

cilindraceo, prima pieno e sodo poi farcito, concolore al cappello, con striature o piccole scanalature verticali, un po' più chiaro nella zona apicale mentre la base presenta residui miceliari.



CARNE

biancastra o grigio biancastra se imbibita di acqua; odore sgradevole di farina rancida o come di pesce.



SPORE

fusiformi e bianche in massa.



HABITAT

crece in autunno, isolata o in piccoli gruppi, nei boschi di latifoglie e di conifere.



COMMESTIBILITÀ

non commestibile, alquanto sospetto.



NOTE

lo si trova nelle zone molto umide e potrebbe facilmente confondersi con *Lepista panaeola* ma se ne distingue per il margine costolato, le lamelle non facilmente separabili (il genere *Lepista* presenta lamelle facilmente separabili dal cappello) e subdecurrenti, il gambo fornito alla base di rizoidi miceliari.

