

## Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr.

50



### CAPPELLO

con diametro che può raggiungere i 6 cm, inizialmente convesso, poi appianato-espanso e con umbone ottuso; igrofano e con cuticola di colore variabile dal rosso ruggine in ambienti molto umidi, al beige-ocra chiaro in condizioni di aridità; nei giovani esemplari il margine risulta essere un po' involuto e spesso velato di bianco.



### IMENOFORO

a lamelle smarginate, abbastanza larghe e irregolarmente panciute, intercalate da lamellule di breve e media lunghezza; inizialmente di colore bruno-violaceo, diventano poi totalmente rugginose.



### GAMBO

di consistenza tenace e con fibrille longitudinali, abbastanza slanciato, leggermente svasato verso l'alto e bulboso alla base; di colore variabile dal bruno-ocraceo al grigio-violaceo, presenta alla base tonalità più scure di rosso-ruggine; cortina chiara e labile.



### CARNE

di colore bruno-rosato e più scura, quasi rugginosa, alla base del gambo; odore di iodio, sapore sgradevole.



### SPORE

di color ruggine in massa.



### HABITAT

crece in autunno e a piccoli gruppi nei boschi di latifoglie, specialmente nelle zone molto umide delle faggete.



### COMMESTIBILITÀ

senza valore; come tutti i *Cortinarius* a carne colorata non è da considerarsi edule.



### NOTE

è una specie di *Cortinarius* facilmente riconoscibile a causa dell'evidente colorazione rosso-ruggine del bulbo basale.

