

Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod

Lepiota amianthina

56

CAPPELLO con diametro che può raggiungere i 5 cm, inizialmente campanulato, poi convesso ed espanso con umbone, infine appianato; cuticola di colore giallo-ocraceo tendente al fulvo, con superficie furfuracea-polverulenta, rugosa e solcata; margine festonato e con orlo decisamente appendicolato.

IMENOFORO a lamelle di colore bianco crema, adnate e fitte.

GAMBO cilindraceo, omogeneo con la trama del cappello, slanciato e calzato da una sorta di guaina o armilla ovvero da un **anello** infero ascendente, quasi concolore al cappello, ricoperto da granulosità e da fioccosità più chiare; nella zona apicale, superiormente all'anello, la colorazione risulta più chiara e tendente al biancastro.

CARNE sottile, fragile, biancastra nel cappello e giallina nel gambo, colorata intensamente di bruno verso la base dello stipe; odore che ricorda il terriccio o la muffa, sapore dolciastro.

SPORE bianche in massa.

HABITAT cresce gregario o in gruppi di alcuni esemplari, dall'estate all'autunno e fino all'inizio dell'inverno, nelle radure dei boschi di conifere e specialmente fra il muschio.

COMMESTIBILITÀ non commestibile.

NOTE

il genere *Cystoderma* si caratterizza per i seguenti caratteri: sporoforo omogeneo e leucosporeo, lamelle adnate, presenza di armilla granuloso-fioccosa.

