

# *Cystoderma terreyi* (Berk. & Broome) Harmaja

*C. cinnabarinum*, *Lepiota cinnabarina*

**57****CAPPELLO**

con diametro che può raggiungere i 7 cm, inizialmente emisferico-convesso, poi espanso e pianeggiante, con largo umbone; cuticola asciutta, pruinosa e finemente granulosa o squamulosa, di colore rosso-arancione o rosso mattone pallido con il tempo secco e che vira al rosso scuro allo sfregamento; margine involuto, poi ondulato e spesso appendiculato per residui bianchi anulari.

**IMENOFORO**

a lamelle adnato-smarginate, bianche, fitte, sottili, sinuose e con lamellule.

**GAMBO**

cilindrico, tozzo, robusto, leggermente ingrossato alla base e spesso anche clavato, subconcolore al cappello o con sfumature arancio pallido; dotato di anello effimero ascendente e rivestito da fioccosità e da squamette arancioni derivanti da una armilla dissociata; la base presenta un feltro miceliare biancastro.

**CARNE**

bianca e tenera, odore e sapore non significativi.

**SPORE**

bianche in massa.

**HABITAT**

crece gregario, dall'autunno inoltrato all'inizio dell'inverno, specialmente nei boschi di conifere, ma anche di latifoglie; si ritrova fra il muschio, le foglie, l'erba o tra residui legnosi marcescenti ed umidi.

**COMESTIBILITÀ**

non commestibile.

**NOTE**

è un fungo molto bello a vedersi.

