

Entoloma hirtipes (Schumach) M. M. Moser

E. mammosum, *Nolanea hirtipes*, *Rhodophyllus hirtipes*

58



CAPPELLO

con diametro che può raggiungere i 7 cm, conico-campanulato e dotato di papilla discale (sorta di piccolo umbone appuntito) più o meno evidente, fortemente igrofano; margine inizialmente involuto, poi dritto ed espanso, leggermente striato per trasparenza; cuticola di colore bruno seppia scuro o bruno-rossastro, più chiara al margine, e con fibrille radiali innate; con il tempo secco lo sporoforo assume tonalità grigio-brunastre e aspetto sericeo e lucente.



IMENOFORO

a lamelle adnate o smarginate, alquanto rade, di colore prima biancastro-pallido poi tendenti, a maturità, al rosa-brunastro; filo concolore e seghettato.



GAMBO

molto slanciato, rastremato verso l'alto e allargato gradualmente alla base dove vi è spesso un feltro miceliare bianco; concolore al cappello e più chiaro all'apice, presenta striature longitudinali di colore argenteo.



CARNE

molto sottile e poco consistente, grigio-brunastra; odore e sapore di farina rancida.



SPORE

rosa in massa.



HABITAT

crece sia sotto latifoglie che conifere, dalla primavera all'autunno inoltrato.



COMMESTIBILITÀ

non commestibile e **sospetto**; alcuni autori ritengono che la sua ingestione possa provocare una **blanda intossicazione** - con sintomatologia a manifestazione incostante e relativa ai diversi soggetti - di tipo gastrointestinale.



NOTE

è un *Entoloma* con portamento micenoi-de.

