

# Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

61

Lingua di bue

**SPOROFORO**

annuale, mensoliforme, di consistenza carnosa, con superficie superiore rugosa dapprima di colore aranciato, poi rosso più o meno scuro e superficie inferiore poroide, giallastra, con pori arrotondati, molto piccoli.

**IMENOFORO**

a tubuli corti, liberi e separati tra di loro, che si aprono all'esterno con piccoli pori arrotondati.

**GAMBO**

non sempre presente, molto rudimentale e corto, eccentrico, rossastro.

**CARNE**

prima molle e giallastra poi più consistente e scura, intrisa di liquido rosso sangue. L'aspetto generale ricorda il fegato, da cui il nome specifico, o la lingua di bue, donde il nome italiano.

**SPORE**

ellittico-ovoidali bianco-ocra in massa.

**HABITAT**

in estate - autunno si sviluppa presso la base di tronchi di latifoglie, particolarmente querce e castagni, che parassitizza determinando una notevole degradazione del legno, nota come carie bruna.

**COMMESTIBILITÀ**

fungo commestibile soprattutto da giovane; taluni lo consumano crudo, dopo aver eliminato la cuticola e i tuboli.

**NOTE**

specie caratteristica, non confondibile con altre.

