

Galerina marginata (Batsch) Kühner

Galera marginata

63



CAPPELLO

1-6 cm, inizialmente emisferico, poi convesso, infine piano, con o senza basso umbone centrale, liscio, igrofano, orlo fortemente striato visibile per trasparenza, di colore ocre chiaro con tempo secco, giallo ambra o bruno rossastro e aspetto untuoso con tempo umido; a causa di tale variabilità, risultano frequenti i cappelli bicolori.



IMENOFORO

a lamelle adnate o leggermente decorrenti, bruno ocre o bruno rossastro, non fitte e con molte lamellule.



GAMBO

sottile, slanciato, concolore al cappello, più scuro verso il basso, con residui biancastri di velo ed anello membranoso ocreo poco consistente.



CARNE

fragile di colore ocre con debole odore ma intenso sapore di farina.



SPORE

ellissoidali, verrucose, bruno rugginoso in massa.



HABITAT

cespitoso su ceppaie e tronchi morti, in particolare di conifere.



COMESTIBILITÀ

mortale; questa specie, insieme alle più note *Amanita phalloides*, *A. verna*, *A. virosa* e ad altre specie, è responsabile di quel tipo di avvelenamento fatale indicato come **sindrome falloidea**.



NOTE

la sua insidiosità è aggravata dalla facilità di confusione con specie commestibili come il *Kuehneromyces mutabilis*, dal quale si distingue per l'orlo del cappello nettamente striato in trasparenza, per le spore verrucose e, soprattutto per l'odore di farina che si sviluppa strofinando le lamelle.

