

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Psilocybe fascicularis

Falso chiodino, Zolfino, Ifoloma amaro, Agarico fasciculato

79

**CAPPELLO**

fino a 7 cm, emisferico, campanulato, convesso, provvisto di umbone poco rilevato, solo tardi appianato, con orlo alquanto appendicolato per residui di velo, superficie liscia giallo limone o giallo arancio con area centrale bruno arancio o bruno rossastro.

**IMENOFORO**

a lamelle adnate, fitte, di color giallo limone cangiante in verde oliva a maturità per la presenza delle spore.

**GAMBO**

cilindrico molto slanciato, dritto o ricurvo, lievemente fibrilloso, giallastro, con cortina effimera che diviene scura per l'accumulo di spore durante la caduta di queste.

**CARNE**

poco consistente, giallastra, decisamente amara.

**SPORE**

ellissoidali o a forma di mandorla, munite di parete doppia e di poro germinativo evidente, bruno scuro violaceo in massa.

**HABITAT**

su legno marcescente in gruppi numerosi, cespitoso, comune quasi tutto l'anno.

**COMMESTIBILITÀ**

tossico.

**NOTE**

il nome volgare di "falso chiodino" ricorda la possibilità di confondere questa specie con *Armillaria mellea*, dalla quale si distingue immediatamente per l'esigua consistenza, il colore delle lamelle e l'assenza di anello.

