

Kuehneromyces mutabilis (Scop.) Singer & A. H. Sm.

Pholiota mutabilis

Agarico mutevole, Foliota mutevole

85**CAPPELLO**

fino a 8 cm, da emisferico ad appianato con umbone arrotondato, margine dotato di piccoli effimeri fiocchi biancastri, superficie liscia, igrofana, di colore fulvo o ambra con umidità elevata, più chiaro, su toni oca o miele a cominciare dal centro, con tempo asciutto.

**IMENOFORO**

a lamelle adnate, alquanto fitte e sottili, inizialmente di colore biancastro, poi giallastre ed, infine, sfumate di grigio-brunastro per la maturazione delle spore.

**GAMBO**

cilindraceo e ricurvo negli esemplari concresciuti; di colore bruno-rossastro alla base, diventa più chiaro verso la sommità dove è presente un **anello** membranaceo oca-brunastro.

**CARNE**

piuttosto molle, bianca se asciutta, brunastra imbibita, di odore fungino e sapore grato.

**SPORE**

ellissoidali lisce o appena verrucose, provviste di un poro germinativo evidente, bruno rossastro in massa.

**HABITAT**

su ceppaie morte di latifoglie, particolarmente faggio, densamente cespitoso, piuttosto comune fin dalla primavera.

**COMMESTIBILITÀ**

commestibile.

**NOTE**

questo ottimo fungo edule rischia di essere scambiato con la **mortale** *Galerina marginata* dalla quale si distingue per i caratteri riportati in nota nella scheda n. 63 dedicata a quest'ultima specie. Si sconsiglia comunque vivamente agli inesperti ogni tentativo di identificazione a scopo alimentare.

