

# Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm.

96



## CAPPELLO

fino a 5 cm, emisferico, campanulato, poi appianato con umbone ottuso, superficie bianca cosparsa di squame bruno rossastre disposte in cerchi concentrici, fini e poco visibili presso il margine, grosse e marcate verso il centro che resta uniforme, di colore rosso brunastro scuro.



## IMENOFORO

a lamelle libere al gambo, fitte, biancastre, con filo fioccoso.



## GAMBO

cilindrico, cavo a maturità, liscio, bianco-rosato, **anello** ben differenziato ma effimero.



## CARNE

biancastra, odore simile a quello degli *Scleroderma*, terroso-metallico.



## SPORE

triangolari, con apicolo laterale, lisce, bianche in massa.



## HABITAT

nei boschi e nei parchi, preferibilmente su terreno aperto, erboso, in gruppi numerosi, in estate-autunno.



## COMMESTIBILITÀ

**velenoso.**



## NOTE

causa avvelenamenti non molto diversi da quelli imputabili ad *A. phalloides*, responsabile di gravissime sindromi tardive; questo fungo molto comune può essere confuso con specie simili, di piccole dimensioni, tutte comunque dotate di tossicità elevata e quindi da evitare con la massima attenzione.

