

Lepista nuda (Bull.) Cooke

Rhodopaxillus nudus, *Tricholoma nudum*
Agarico violetto, Violone

- CAPPELLO** fino a 15 cm, da convesso ad appianato, talvolta alquanto depresso al centro o umbonato, margine involuto, poi disteso, spesso sinuoso, superficie liscia, violetto-lilacina più o meno uniforme, brunastra verso il centro, tendente a sfumare verso l'ocraceo con l'età.
- IMENOFORO** a lamelle adnato-uncinate, fitte, con lamellule, di colore lilla cangiante verso il brunoastro.
- GAMBO** da cilindrico a clavato, sodo, fibrilloso, lilla-violetto da giovane, biancastro con l'età, fioccoso verso l'apice.
- CARNE** grigio-violacea, odore fortemente aromatico, fruttato, sapore mite.
- SPORE** ellissoidali, finemente verrucose, rosa in massa.
- HABITAT** nei boschi di latifoglie e conifere, ma anche nei parchi, su terreno ricco di sostanza organica, in gruppi numerosi, spesso disposti in linee o cerchi, in autunno-inverno.
- COMMESTIBILITÀ** commestibile dopo cottura.

NOTE
questo fungo è confondibile con diverse specie simili (*L. sordida*, *L. personata*) prive di tossicità ma scarsamente o non commestibili.

