

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.

R. langei

Colombina iridescente, Colombina maggiore

136



CAPPELLO

il diametro può raggiungere i 15 cm, da emisferico a spianato, carnoso e compatto, con cuticola asportabile fino a metà raggio; il colore varia dal rosso-violetto al lilla, dal porpora al grigio-brunastro o al grigio-ardesia e fino al bluastro, con diffuse tonalità grigio-verdastre.



IMENOFORO

a lamelle più o meno fitte, adnate o un po' decorrenti, venoso-congiunte, a volte biforcute all'inserzione; di colore biancastro e fino al giallino, sono tipicamente lardacee ovvero sembrano untuose al tatto.



GAMBO

cilindraceo, alto 8-10 cm, di colore bianco e, a volte, un po' sfumato di lilla o macchiato di bruno; inizialmente pieno poi cavernoso-farcito.



CARNE

bianca, inizialmente molto compatta e consistente, poi spugnosa; sotto la cuticola risulta essere un po' lilacina-violetta; il sapore è gradevole e mite.



SPORE

di colore bianco in massa, ellisodali-ovoidali e con verruche.



HABITAT

ubiquitario e comune all'inizio della stagione estiva.



COMMESTIBILITÀ

commestibile; alcune normative regionali hanno incluso la *R. cyanoxantha* nell'elenco dei funghi epigei spontanei commercializzabili.



NOTE

le lamelle lardacee e che non si frantumano alla pressione delle dita costituiscono un carattere peculiare di riconoscimento, nonostante l'ampia variabilità cromatica del cappello; potrebbe essere confusa con la *Russula langei* che presenta però lamelle più o meno elastiche e non lardacee.

