

# Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.

*T. auratum*, *T. flavovirens*

Agarico dei cavalieri

159



## CAPPELLO

il diametro può raggiungere i 13 cm; emisferico, campanulato, poi appianato e con leggero umbone ottuso, carnoso e con margine sottile, involuto che poi diventa disteso e anche lobato, dal colore giallo cromo o giallo dorato si presenta leggermente vischioso e brillante con l'umidità ed, a volte, con piccolissime fibrille al centro di colore bruno-rossastro.



## IMENOFORO

a lamelle fitte, da libere a smarginate sul gambo, con numerose lamellule, di colore giallo citrino - giallo oro e con filo concolore non seghettato.



## GAMBO

subcilindraceo e con base un po' clavata oppure tozzo e panciuto, sodo, concolore al cappello e un po' brunastro alla base.



## CARNE

soda, bianco-giallastra, fibrosa nel gambo, con odore farinoso molto gradevole, sapore mite.



## SPORE

bianche in massa e dalla forma largamente ellissoidale.



## HABITAT

nei boschi di latifoglie e di conifere.



## COMMESTIBILITÀ

**sospetto**; in Italia, a scopo preventivo, la specie è stata esclusa dall'elenco dei funghi commercializzabili.



## NOTE

questa specie, fino a pochi anni fa, veniva considerata commestibile e commercializzabile. Tuttavia, recentemente, in Francia si sono registrati **vari casi di intossicazioni** associate a particolari patologie (raddomiolisi) ed attribuibili alla assunzione di tale fungo.

