

# Tricholoma portentosum (Fr.) Quéf.

162

Agarico portentoso, Cicalotto



## CAPPELLO

il diametro può raggiungere i 12 cm; inizialmente convesso, campanulato e con umbone ottuso, poi appianato. La cuticola vischiosa, con tempo umido e separabile, presenta fibrillature innate disposte radialmente; il colore varia dal grigio-olivastro al grigio-ardesia e al nerastro fuliginoso con sfumature violacee; il margine è sinuoso o lobato ed, a maturità, presenta delle incisioni radiali.



## IMENOFORO

a lamelle poco fitte più o meno smarginate, bianco sporco con sfumature gialline; filo irregolare ed a volte seghettato.



## GAMBO

cilindraceo, robusto e a volte un po' affusolato verso il basso, biancastro e con sfumature gialle specialmente verso l'alto, può raggiungere gli 8-12 cm di altezza.



## CARNE

soda e consistente, da bianca a giallastra; odore farinoso, sapore dolce.



## SPORE

bianche in massa e se osservate al microscopio dalla forma ellissoidale.



## HABITAT

crece in autunno nei boschi di conifere, specialmente nelle pinete, e di latifoglie.



## COMMESTIBILITÀ

commestibile.



## NOTE

si tratta di una specie commercializzabile sia allo stato fresco che conservato ed inserita nell'elenco nazionale (All. I e All. II) del DPR 376/95.

Il *Tricholoma portentosum* potrebbe confondersi con il *Tricholoma josserandii* che presenta cappello asciutto e feltrato ed, alla frattura, intenso odore di cimice.

