

Tricholoma sejunctum (Sowerby) Quéf.

165



CAPPELLO

inizialmente conico-campanulato diventa poi appianato e presenta anche, a volte, un largo umbone; il diametro può raggiungere i 12 cm, la cuticola, di colore giallo-verdastro o verde-olivastro con tonalità brune, è percorsa da evidenti fibrille radiali ed appare vischiosa con il tempo umido mentre, in ambiente secco, risulta lucente e sericea; il margine è liscio, ondulato e lobato ed a volte fessurato.



IMENOFORO

a lamelle bianco-crema un po' ingiallenti sul filo e verso il margine del cappello, smarginate-uncinate al gambo.



GAMBO

cilindraceo o irregolare, alto 6-10 cm, pieno, bianco con sfumature gialline nella parte superiore.



CARNE

bianca ma sfumata di giallo-verdastro sotto la cuticola; odore farinaceo, specialmente se si strofina o si seziona lo sporoforo, sapore amarognolo.



SPORE

bianche in massa e se osservate al microscopio con morfologia ovoidale-ellissoidale.



HABITAT

crece in gruppi, in boschi di latifoglie ma anche di conifere, dall'estate all'autunno.



COMMESTIBILITÀ

sospetto e non commestibile, provoca una sindrome gastroenterica di breve incubazione, con periodo di latenza variabile dai 15 minuti alle 4 ore.



NOTE

può essere confuso con la mortale *Amanita phalloides*, specialmente da giovane, ma quest'ultima - oltre ad essere un fungo eterogeneo ovvero con facile separabilità dello stipite dal pileo - presenta una volva ed un gambo con anello.

