

Agaricus campester L.

A. campestris, *Psalliota campestris*

Prataiolo campestre

4

 **CAPPELLO** il diametro può raggiungere i 15 cm; carnoso e asciutto, inizialmente cupoliforme, poi appiannato, bianco e con leggere sfumature di colore rosa-giallino e con il margine spesso appendicolato; fibrilloso e fioccoso, con il tempo secco tende ad ingiallire.

 **IMENOFORO** a lamelle fitte e libere al gambo; prima rosa pallido, successivamente più scure ed infine bruno scuro e con tagliente fertile.

 **GAMBO** bianco, cilindrico, finemente granulato, corto o slanciato e con base attenuata; con **anello** bianco a gonnellino che a maturità diventa inconsistente ed indistinto, quasi fugaceo; al di sotto della zona anulare risulta ingiallente al tocco.

 **CARNE** bianca al taglio, lievemente rosata nella parte alta del gambo, odore di anice o mandorle, sapore grato.

 **SPORE** bruno-scuro, quasi cioccolato in massa.

 **HABITAT** cresce nei prati e nelle radure erbose dei boschi, dall'estate all'autunno.

 **COMMESTIBILITÀ** ottimo commestibile; è un fungo commercializzabile sia allo stato fresco che conservato ed è inserito nell'elenco nazionale (All. I e All. II) del DPR 376/95.

 **NOTE**
è una specie facilmente riconoscibile.

