

# Amanita citrina (Schaeff.) Pers.

9



## CAPPELLO

con diametro che raggiunge anche i 12 cm, si presenta mediamente carnoso ed abbastanza fragile; inizialmente con morfologia conico-campanulata diventa poi emisferico e, successivamente, piano-convesso ed a volte mostra una leggera depressione al centro. La cuticola, interamente asportabile, si presenta liscia al margine del cappello e di colore variabile dal bianco-crema intenso al bianco-citrino o completamente biancolatte nella varietà *alba*; inoltre, può essere ornata da residui del velo generale ovvero da placche verrucose irregolari di consistenza farinosa biancastre o ocracee.



## IMENOFORO

con lamelle bianche che assumono particolari toni citrini, libere, molto fitte, con lamellule tronche.



## GAMBO

alto fino a 12 cm, bianco-giallastro, cilindraceo ed attenuato all'apice ma con bulbo basale prominente e nettamente marginato; l'**anello** risulta essere ampio membranoso e permanente, pendulo e giallino; la **volva** si presenta bulbosa biancastra-giallina, membranacea, adnata e circonscisa.



## CARNE

biancastra, più consistente nel cappello, con odore di rapa e sapore dolciastro.



## SPORE

di colore bianco in massa.



## HABITAT

in boschi di latifoglie e di conifere; cresce isolato o gregario dall'estate all'autunno inoltrato. È un fungo comunissimo in tutto il territorio italiano e si ritrova nei più svariati ambienti boschivi.



## COMESTIBILITÀ

non commestibile seppure non tossico e di pessime qualità organolettiche.



## NOTE

È un fungo da evitare in quanto confondibile con alcune forme pallide della mortale *Amanita phalloides* da cui, però, si differenzia per la presenza della placche pileiche bianco-ocracee, della volva circonscisa ed aderente al bulbo e dell'odore rafanoide. La cuticola se cimentata con l'acido solforico (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) assume una colorazione bruno olivastra mentre l'orlo delle lamelle, a contatto con una soluzione di idrossido di potassio (KOH), diventa marrone.

Insieme all'*Amanita porphyria* appartiene alla sezione *Mappae*; tuttavia, si differenzia da essa in quanto quest'ultima presenta un cappello e un gambo di colore bruno-grigiastro.



9 - Amanita citrina