

# Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

*Lepista nebularis*

Agarico nebbioso, Nebbione, Ordinale

37



## CAPPELLO

può raggiungere il diametro di 20 cm, sodo, inizialmente convesso diventa poi spianato e qualche volta depresso al centro; cuticola di colore variabile da grigio chiaro oca a grigio scuro, di aspetto liscio, finemente feltrato, lucente con il tempo secco; margine ondulato-lobato ed involuto.



## IMENOFORO

a lamelle adnate o leggermente decorrenti, bianco-giallognole, molto fitte.



## GAMBO

da obeso a clavato, di colore più chiaro del cappello, inizialmente fibroso e sodo poi farcito e un po' molle; superficie percorsa da fini fibrille e base con feltro miceliare biancastro.



## CARNE

bianca, consistente e con odore forte e intenso, inizialmente gradevole, poi un po' nauseante.



## SPORE

di colore crema in massa.



## HABITAT

crece gregario dalla fine dell'estate all'autunno, nei boschi di latifoglie, disponendosi in file o gruppetti di esemplari o, a volte, nei cosiddetti "cerchi delle streghe".



## COMMESTIBILITÀ

**tossico** ed assolutamente da evitare, la sua assunzione - specialmente se ripetuta nel tempo - provoca gravi danni al fegato.



## NOTE

si tratta di una specie che in alcune zone d'Italia viene consumata; tuttavia, se ne è accertata la tossicità e l'intolleranza per alcuni individui.

