

Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers.

46

Agarico chiomato, Coprino brillante



CAPPELLO

interamente ovoidale-allungato, poco carnoso e che può raggiungere una notevole altezza, ricoprendo anche gran parte del gambo; cuticola di colore biancastro o camoscio al centro, sericea, decorata da piccole ed irregolari squame embricate concolori che conferiscono al fungo un aspetto fioccoso.



IMENOFORO

a lamelle libere al gambo, molto alte, di colore inizialmente biancastro poi rosa pallido ed infine nere, deliquescenti a partire dal margine verso l'alto.



GAMBO

molto alto e slanciato, radicante, internamente cavo, esternamente più o meno liscio o con leggerissime striature longitudinali; base leggermente bulbosa-napiforme; **anello** biancastro, mediano e libero che, a volte, scivola verso la base.



CARNE

inizialmente bianca, dal sapore delicato e di odore gradevole; con l'inizio dei fenomeni di deliquescenza diventa rosa pallido e, successivamente, nerastra ed immangiabile.



SPORE

nere in massa.



HABITAT

crece nei luoghi erbosi e concimati, nei parchi, ai bordi delle strade, nei pascoli di montagna, raramente all'interno dei boschi, dalla primavera all'autunno.



COMMESTIBILITÀ

eccellente, ma da consumarsi solo se le lamelle sono interamente bianche.



NOTE

si tratta dell'unica specie commestibile del genere *Coprinus* - non molto ricercata e conosciuta dalla maggior parte dei cercatori - considerata, da alcuni autori, tra le migliori specie eduli; il fungo può consumarsi solo quando lo sporoforo è giovane e con le lamelle perfettamente bianche e non deliquescenti.

