

# Cortinarius elatior Fr.

*C. lividoochraceus*



## CAPPELLO

con diametro che può raggiungere i 15 cm, inizialmente convesso-campanulato poi disteso e con margine rugoso-striato-scanalato fin quasi a metà del raggio; cuticola di colore variabile dal bruno-olivaceo all'ocra paglierino o al grigio-lilla con riflessi violacei.



## IMENOFORO

a lamelle smarginato-adnate di colore brunastro o beige-ocraceo e filo dentellato più chiaro, abbastanza fitte, molto irregolari e con facce segnate da vene trasversali.



## GAMBO

abbastanza robusto, slanciato ed attenuato alle estremità, sia in alto che alla base fusiforme ed un po' radicante; pieno e sodo, biancastro verso l'apice e sfumato di lilacino-violaceo chiaro nella parte centrale; striato longitudinalmente nella zona al di sopra della cortina, lacerato o desquamato-fioccoso al di sotto di quest'ultima.



## CARNE

biancastra o crema, con un alone brunastro sotto la cuticola, piuttosto fibrosa; sapore dolce ed odore vagamente mielato.



## SPORE

di color ruggine in massa.



## HABITAT

crece in autunno inoltrato e fino a dicembre, nei boschi di latifoglie.



## COMMESTIBILITÀ

non commestibile, scadente.



## NOTE

l'odore vagamente di miele, il gambo fusiforme, il colore del cappello con il margine scanalato-striato, la morfologia delle lamelle consentono la sua rapida determinazione.

