

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen.) Maire

Clitocybe aurantiaca

Falso galletto

75

CAPPELLO fino a 8 cm, a maturità appianato, depresso al centro, con superficie asciutta, leggermente feltrata, giallo arancio più o meno intenso, orlo più chiaro.

IMENOFORO a lamelle decorrenti, spesse, forcate, da giallastro ad arancio più o meno intenso.

GAMBO cilindrico, concolore al cappello, cavo a maturità.

CARNE soffice, giallastra, priva di odore e sapori particolari.

SPORE ellissoidali, lisce, biancastre o giallo molto chiaro in massa.

HABITAT cresce in boschi di conifere e latifoglie, su residui vegetali in decomposizione, singolarmente o in piccoli gruppi, dall'estate all'autunno. Non molto frequente.

COMESTIBILITÀ **sospetto**; sotto l'aspetto tossicologico, le opinioni correnti risultano piuttosto contraddittorie, da una parte asserendo la commestibilità, dall'altra la tossicità della specie in questione. Si consiglia, in ogni caso, di non consumare gli sporofori di tale specie.



NOTE

potrebbe essere confusa con *Cantharellus cibarius*, commestibile, e con *Omphalotus olearius*, tossico. Il primo è riconoscibile per le venature decorrenti dell'imenoforo, ben distinte da vere lamelle, il secondo per lo sviluppo cespitoso e la presenza di numerose lamellule.