

Suillus bellini (Inzenga) Kuntze

Boletus bellinii, *B. boudieri*
Pinarello di Bellini

150



CAPPELLO

il diametro, generalmente, può raggiungere i 14 cm; inizialmente emisferico convesso, poi espanso con il margine quasi sempre involuto specie nei giovani esemplari; la cuticola, di colore variabile dal biancastro al nocciola bruno rossastro, si presenta viscida e totalmente asportabile.



IMENOFORO

a tubuli mediamente corti, poco separabili, un po' decorrenti, bianco giallastri poi verdastri; i pori si presentano piccoli ed angolosi, nei giovani esemplari secernono piccole goccioline.



GAMBO

cilindrico, corto e tozzo, attenuato verso il basso ed a volte un po' eccentrico, ricoperto da fine granulazione bruno ocrea su fondo bianco-giallino.



CARNE

soda e consistente, bianca e un po' giallina subito sopra i tubuli mentre sotto la cuticola appare rosso-vinosa. Odore fruttato, sapore dolce.



SPORE

ocreee in massa, dalla forma ellissoidale e apiculata.



HABITAT

specie associata ai pini a due aghi sotto i quali si ritrova in gruppi di numerosi esemplari.



COMMESTIBILITÀ

commestibile discreto, ma **si consiglia di togliere la cuticola**. In alcuni individui particolarmente sensibili, si sono manifestati effetti gastroenterici lassativi.



NOTE

i colori variano in funzione dello sviluppo del fungo.

