

# Suillus bovinus (L.) Roussel

*Boletus bovinus*, *Ixocomus bovinus*

Boleto bovino

151



## CAPPELLO

il diametro, generalmente, può raggiungere i 12 cm; inizialmente emisferico-convesso poi spianato, con margine prima involuto ma che si distende a maturità; di consistenza gommoso-elastica, presenta una cuticola vischiosa con l'umidità e liscia-lucente con il tempo secco; colore variabile dal rosa-arancio al giallo oca-brunastro o al fulvo-marrone.



## IMENOFORO

a tubuli corti (al massimo 1 cm), da adnati a decorrenti sul gambo, prima gialli e poi di colore giallo-verde-brunastro, difficilmente separabili dalla carne del cappello; i pori inizialmente sono piccoli, rotondi e gialli, ma nell'adulto diventano larghi ed angolosi e verde-bruno-olivastri.



## GAMBO

cilindraceo ed attenuato alla base, più o meno con colore al cappello e più chiaro all'apice; alla base presenta spesso residui miceliari e filamenti di colore rosaceo.



## CARNE

elastica e un po' gommosa, poi molle, bianco-giallognola ed immutabile al taglio; sapore un po' dolciastro.



## SPORE

di colore bruno-olivastro in massa e di forma ellissoidale.



## HABITAT

crece, specialmente, sotto i pini a due aghi, ed in gruppi costituiti da numerosi esemplari.



## COMMESTIBILITÀ

commestibile ma piuttosto scadente. Sconsigliabile in quanto molle e tendente al violaceo con la cottura.



## NOTE

è una specie molto comune e, spesso, condivide il proprio habitat con il *Gomphidius roseus* dal cappello di colore rossastro.