

Tricholoma acerbum (Bull.) Quél.

155

-  **CAPPELLO** il diametro può raggiungere i 12 cm; emisferico globoso, poi convesso-guancialiforme, con orlo molto involuto e costolato, cuticola vellutata, vischiosa con l'umidità e separabile totalmente; il colore varia dal bianco giallastro al beige giallo paglierino, fino al crema brunastro negli esemplari maturi.
-  **IMENOFORO** a lamelle fitte, regolari ed uncinato al gambo, con presenza di numerose lamellule; di colore bianco-giallastro, le lamelle risultano - a volte - ornamentate da puntini rugginosi.
-  **GAMBO** sodo, cilindrico, fibroso, asciutto, macchiato di bruno negli esemplari maturi e punteggiato di giallo all'apice, concolore al cappello.
-  **CARNE** biancastra, soda e compatta, immutabile al taglio; dal sapore mite e con odore gradevole di frutta.
-  **SPORE** bianche in massa ed ellissoidali-ovoidali.
-  **HABITAT** cresce in gruppi di numerosi esemplari in boschi di latifoglie e su suolo calcareo, dall'estate al tardo autunno.
-  **COMMESTIBILITÀ** commestibile.



 **NOTE**

è una specie che si ritrova sempre più difficilmente a causa dell'attuale cambiamento climatico.