

# Tricholoma squarrulosum Bres.

166



## CAPPELLO

può raggiungere il diametro di 8 cm; inizialmente campanulato-convesso, poi convesso-umbonato ed infine disteso-umbonato con cuticola squamosa ovvero con evidenti squamette di colore grigio-nerastro su fondo chiaro; le squame sono più appresse al disco che appare quasi nerastro.



## IMENOFORO

a lamelle abbastanza fitte che inizialmente sono bianche ma poi assumono sfumature grigie con filo punteggiato di nero, smarginate-adnate al gambo.



## GAMBO

cilindraceo ed attenuato verso l'alto può raggiungere l'altezza del diametro pileico; inizialmente pieno e poi midolloso è ricoperto da squamule e fibrille nerastre.



## CARNE

da bianca a grigiastra con odore misto di farina e pepe nero.



## SPORE

bianche in massa e con morfologia ovoidale-ellissoidale.



## HABITAT

crece gregario, a piccoli gruppi, nei boschi misti con prevalenza di querce, faggi e pini silvestri, nei querceti delle regioni calde e nella macchia mediterranea.



## COMMESTIBILITÀ

commestibile e buono.



## NOTE

è uno dei "tricolomi" più tardivi in quanto la sua crescita avviene nel tardo autunno. Lo si distingue dalle altre specie di *Tricholoma* del gruppo delle "morette" o del *Tricholoma terreum*, in quanto il gambo risulta essere fibrilloso-squamuloso.

